

## Externe Qualitätssicherung

### „Carotischirurgie“

Jahresauswertung 2008 der Qualitätssicherung nach §137 SGB V

Modul 10/2 Carotis-Rekonstruktion

#### Vergleich Henriettenstiftung / Niedersachsen

	Henriettenstiftung	Niedersachsen
Stationär postoperativ (Tage)	4,7	7,2
ASA-Klassifikation II (%)	12	21
ASA-Klassifikation III (%)	88	62
Prae-und postoperative fachneurologische Untersuchung (%)	100	54
Operationsdauer (min)	80	97
Abklemmdauer (min)	4,8	14
Neuromonitoring (%)	100	55
OP-pflichtige Nachblutung (%)	2,4	3,0
Nervenläsion (%)	2,4	1,6
Wundinfektion (%)	0	0
Kardiale/Pulmonale Komplikation (%)	4,8	6,0
<b>Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen asymptomatischer Pat.(%)</b>	<b>0</b>	<b>2,50</b>
<b>Rate an perioperativen Schlaganfällen symptomatischer Pat.(%)</b>	<b>0</b>	<b>3,50</b>
<b>Anteil an Fällen mit schweren * Schlaganfällen oder Tod (%)</b>	<b>2,38</b>	<b>2,20</b>
<b>Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen (risikoadjustiert) nach dem log. Carotis-Score I (%)</b>	<b>2,18</b>	<b>1,76</b>

\* 1 Pat, Jhrg. 1916 verstorben bei dekompensierter Herzinsuffizienz und Pneumonie  
1 Pat. verstorben bei postoperativer Hirnmassenblutung unter hypertoner Krise