




Externe Qualitätssicherung
„Carotischirurgie“



Jahresauswertung 2009 der Qualitätssicherung nach §137 SGB V
Modul 10/2 Carotis-Rekonstruktion

Vergleich Henriettenstiftung / Niedersachsen

	Henriettenstiftung	Niedersachsen
Stationär Gesamtaufenthalt (Tage)	7,4	10,2
Stationär postoperativ (Tage)	4,9	6,8
ASA-Klassifikation II (%)	18	20
ASA-Klassifikation III (%)	81	76
Prä- und postoperative fachneurologische Untersuchung (%)	96,2	56
Operationsdauer (min)	80	92
Neuromonitoring (%)	100	65
OP-pflichtige Nachblutung (%)	2,5	2,4
Nervenläsion (%) *	3,8 *	1,3
Wundinfektion (%)	0	0,3
Kardiale/Pulmonale Komplikation (%)	1,3	3,9
Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen asymptomatischer Pat.(%)	0	2,7
Rate an perioperativen Schlaganfällen symptomatischer Pat.(%)	0	3,2
Anteil an Fällen mit schweren Schlaganfällen oder Tod (%)	0	1,3
Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen (risikoadjustiert) nach dem log. Carotis-Score I (%)	0	3,3

* 3 passagere Nervenirritationen waren bei Entlassung nicht mehr nachweisbar